



くすの木

基本理念：地域に信頼され親しまれる病院を目指します。

野村病院だより「くすの木」は、医療法人メディカルパークのトピックスやイベント等をお知らせする情報満載の季刊誌です。

祝！人工関節センター開設2周年

Vol. 99
2025.6



変形性股関節症の治療実績

手術件数
208件

第1位

広島県
ランキング

第33位

全国
ランキング

〈2023年4月～2024年3月〉

変形性膝関節症の治療実績

手術件数
50件

第12位

広島県
ランキング

〈2023年4月～2024年3月〉

今後も患者様一人ひとりに適した
人工関節を見極め、専門性を追求した
高度な手術を提供していきます。

Dr. 寺山



◀ 病院長補佐就任のご挨拶 ▶

令和7年4月1日より、病院長補佐として就任いたしました、
多幾山 渉と申します。

診療科は外科で専門は食道、胃、大腸など消化管のがん治療です。今まで、広島大学原医研腫瘍外科、四国がんセンター、安佐市民病院などで、これらの患者様の手術や化学療法、術後のケアと共に外科救急医療などに長年にわたり取り組んでまいりました。その後、世羅中央病院で地域医療に携わり、広島グリーンヒル病院では高齢者などの終末期医療の経験も致しました。

今後はこれらの経験を生かし、スタッフと共に地域に信頼され親しまれる医療の提供に微力ではありますが、貢献していきたいと思っています。ご支援ご協力の程宜しく申し上げます。



病院長補佐 多幾山 渉

教えて!

高永甲先生!

甲状腺機能亢進症(主にバセドウ病)のリスクについて



病院長補佐 高永甲 文男

専門領域: 外科・乳腺外科・甲状腺外科・
消化器外科

甲状腺中毒症の中で、甲状腺でのホルモン合成が高まった結果、ホルモン分泌が亢進して甲状腺中毒症を引き起こしている状態を「甲状腺機能亢進症」と呼びます。甲状腺機能亢進症の中で、最も多いのはバセドウ病です。特に日本人の場合は、90%以上はバセドウ病です。

バセドウ病は、自己免疫によって甲状腺を異常に刺激する抗体(TSH受容体抗体=TRAb)ができ、この抗体が他から異物と間違えて甲状腺を刺激し甲状腺ホルモンをどんどんつくらせてしまう病態です。症状は、甲状腺腫大、動悸、頻脈、眼球突出(20~30%)、体重減少、下痢、手指振戦、暑がり、多汗、月経異常、イライラ感などです。診断は、血液検査で甲状腺機能亢進状態およびTRAb(またはTSAb)陽性でバセドウ病疑いです(感度: TRAb 98.3%、TSAb 99.2%)。エコーでは甲状腺左右対称なびまん性甲状腺腫大がみられ、低エコー所見はなく、甲状腺内血流は豊富です。治療は抗甲状腺薬、I-131内用療法、手術ですが、多くは抗甲状腺薬です。抗甲状腺薬は、内服するだけの簡便な治療法ですが、副作用への注意が必要なこと、完解率は必ずしも高くないことが問題です。

甲状腺機能亢進症のリスク

I. 病状のリスク(多岐の症状による診断の遅れ)

- ① 高齢の甲状腺機能亢進症の場合、10%以上に心房細動が合併しています。
- ② 心筋に作用し収縮力を高め心拍数を増加させて、心不全が発症します。
- ③ 死亡率10%の甲状腺クリーゼが、稀に発症します(全甲状腺中毒者の0.22%)。

II. 診断のリスク(誤診断による誤治療の発生)

下記のバセドウ病以外の甲状腺機能亢進症の疾患との鑑別診断が必要です。

- ① 亜急性甲状腺炎: 治療はステロイドまたは非ステロイド系消炎鎮痛薬。抗甲状腺薬の投与は禁忌。
- ② 無痛性甲状腺炎: 3か月後以内に甲状腺中毒症は改善。抗甲状腺薬の投与は禁忌。



③橋本病の急性増悪：治療はステロイドは通常勧められません。抗甲状腺薬の投与は禁忌。

④機能結節：治療は手術、I-131内用療法、抗甲状腺薬の投与など。

⑤その他（中枢性疾患、薬など）。抗甲状腺薬の投与は禁忌。



Ⅲ.治療のリスク（抗甲状腺薬による副作用）

①臨床ではメチマゾール（MMI）、プロピルチオウラシル（PTU）、ヨウ化カリウム（KI）の3種類が使用されています。

抗甲状腺薬の第一選択薬は、効果、副作用からはMMIが推奨されますが、催奇形性が報告されています。妊娠時は、このため妊娠4週0日～15週6日までの期間はMMIを使用しないようにし、PTUで治療します。軽症の場合は、ヨウ化カリウム丸50mgの使用が可能です。

②MMI、PTUは、無顆粒球症が発症することがあり、服用開始3か月以内に起こります。このため、服用開始2か月間は原則として2週間に1回血液の測定をすることが定められています。再投与時も同様なことが必要です。その他の副作用として、薬疹、肝機能障害、関節痛も確認する必要があります。稀に、血管炎から急性進行性腎炎が発症することがあり、これはPTUの方が多いようです。小児ではPTUは劇症肝炎が発症することがありますので投与しないようにします。

バセドウ病は日常診療の中でしばしば遭遇する疾患ですが、意外なリスクがありますので、それらを踏まえて安全な医療をめざしていく必要があると考えています。



R7年 4月12日（土） ホテルグランヴィア広島にて

歓迎会を開催いたしました

平成31年4月に開催された歓迎会以降コロナ禍の為、開催自粛を行なってきましたがこの度6年ぶりに開催する事が出来ました。

久しぶりの開催に96名が参加し、楽しく有意義な時間を過ごす事ができました。

この間にたくさんの新しい仲間ができました。全ての人を紹介することはできませんでしたが、15名の方を皆様の前で紹介し、自己紹介・抱負などフレッシュな意見をいただき、職員一同また気持ちを新たに頑張っていこうと一致団結できました。



外 来 診 療 担 当 医 一 覧

科 目	時 間	月	火	水	木	金	土
消 化 器 内 科	午 前		三 田 村		辰 川		
	午 後		三 田 村		○	長 崎	
循 環 器 内 科	午 前	落 海		北 川		東	
	午 後				○		
外 科	午 前	井 上		小 西	多 幾 山	多 幾 山	井上・小西
	午 後	小 西			○	小 西	
乳 腺	午 前	高永甲・木村	高永甲	高永甲		高永甲	高永甲(第1・3・5)
	午 後		高永甲	高永甲	○	高永甲	
整 形 外 科	午 前	寺山・武田	内 藤	寺山・隅田	寺山・内藤	内 藤	寺山(第1・2・3・4) 内藤(第5)
	午 後			寺 山	○		
神経内科パーキンソン専門外来	午 前						久米(第1・3・5) 森野(第2)
神経内科てんかん・頭痛・物忘れ外来	午 後			荒 木	○		
脳 神 経 外 科	午 前						
	午 後		広島大学(16:00まで)		○	広島大学(16:00まで)	

○…お電話にて、お問い合わせください。

外 来 診 療 の ご 案 内

- 内科(消化器・循環器・呼吸器・内分泌・神経・内視鏡)
- 外科(消化器・肛門・乳腺・呼吸器)
- リハビリテーション科 ●皮膚科
- 脳神経外科 ●整形外科 ●麻酔科

受付

TEL 082-875-1111

FAX 082-850-2825(地域連携室直通)
受付時間/午前8:30~12:00 午後13:00~17:00

午前中の診療は予約制です。ご予約のない患者様は担当医以外の診察となる場合がありますのでご了承ください。

総合診療科 診察時間

	月	火	水	木	金	土	日・祝
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	休
午後 14:00~17:00	○	○	○	○	○	休	休

※ただし初診および急患は予約の有無に限らず随時診察いたします。

アクセスMAP



- 広交バス「祇園出張所前」下車・徒歩3分
- 可部線「下祇園駅」下車・ゆめテラス祇園方面へ徒歩3分



医療法人メディカルパーク
野村病院

〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目42-14
TEL 082-875-1111 FAX 082-875-6125
<https://www.medical-park.jp/>